



Nombre latín: *Periplaneta americana*

Nombre vulgar: Cucaracha americana.

Orden: Dictioptera

Familia: Blattidae

Los adultos tienen una medida comprendida entre 3,4 y 5,3 cm. Las ninfas tienen medidas inferiores. Su coloración es amarillada con tonalidades rojizas en las alas, que cubren totalmente el abdomen.

Son características de la especie la presencia de bandas de color marrón claro situadas en el pronoto, parte inmediatamente posterior a la cabeza.

Son de hábitos nocturnos y es frecuente observarlas en lugares húmedos y muy cálidos.

Se encuentran principalmente en grandes edificios comerciales donde se manipulen o almacenen alimentos, pero también en el interior de las viviendas.

Generalmente provienen de la red de cloacas y acceden a los locales y viviendas a través de los elementos del sistema de alcantarillado como pueden ser desguaces.

Es muy importante su control ya que pueden ser vectores de bacterias, virus, quistes de protozoos y hongos.

La hembra grávida forma una ooteca, cápsula que contiene los huevos y los protege, y la deposita en un lugar seguro. La incubación se completa a los 50-55 días, según condiciones de temperatura. Los individuos eclosionados, ninfas, buscarán lugares de refugio próximos a fuentes de alimento para completar su desarrollo.

Es importante mantener en buen estado el sistema de desguaces y bajantes de aguas residuales así como unas correctas condiciones higiénicas para evitar su proliferación

Imagen por cortesía de Bayer AG