



Nombre latín: *Cimex lectularius*

Nombre vulgar: Chinche de las camas

Orden: Hemiptera

Familia: Cimicidae

La longitud media es de 6 mm. y presentan una coloración oscura, a veces con tonalidades rojizas. No presenta alas y el abdomen, en comparación con la cabeza y el tórax, es de grandes dimensiones.

Su actividad es básicamente nocturna, durante las horas diurnas pueden encontrarse refugiadas en grietas y hendiduras diversas, siempre cerca de las zonas de alimentación. Se pueden encontrar refugiadas en paredes, marcos de puertas, detrás de los cabezales y mesitas de noche, cuadros, zócalos, debajo del entarimado, en alfombras y moquetas. También pueden observarse en los pliegues y costuras de somieres y colchones.

Durante las horas nocturnas, atraídas por el calor y el CO₂ que desprenden las personas, se alimentan picando sobretodo en partes del cuerpo no protegidas por la ropa como cuello, brazos y manos, cara y zona lumbar.

No implican ningún problema sanitario, sólo molestias por las picadas y sensibilización, por parte de ciertas personas, a la saliva de estos insectos, provocando lesiones cutáneas irritantes y inflamatorias.

La hembra puede poner entre 200 y 400 huevos durante toda su vida, con una generación cada 2 meses aproximadamente.

La invasión de estos insectos siempre es exterior por introducir en espacios libres materiales infestados, como colchones, maletas, muebles, etc.

Imagen por cortesía de Bayer AG