



Nombre latín: *Linepithema humile*

Nombre vulgar: Hormiga argentina

Orden: Hymenóptera

Familia: Formicidae

Las obreras miden aproximadamente 3,5 mm. con una coloración marronosa oscura. Son monomórficas, la casta de obreras presentan la misma morfología.

Presentan una gran capacidad para modificar sus zonas de anidación, aprovechando cualquier grieta o hendidura para establecerse.

También es muy elevada su capacidad para modificar rutas de actividad, esto puede dificultar su control a corto plazo.

El número de colonias en una determinada área puede ser numeroso formando supercolonias con un gran número de obreras, desde cientos a miles de individuos.

Prefieren los alimentos ricos en azúcares, alimentándose también de líquidos, secreciones de plantas y pulgones (nectarívoras). También pueden alimentarse de pequeños insectos o alimentos que contengan cierta cantidad de proteína.

La puesta de los huevos empieza a finales de marzo, cuando la temperatura supera los 20 °C y puede alargarse hasta finales de noviembre. Durante el invierno muestran una reducción en su actividad.

Los vuelos nupciales se producen desde finales de abril hasta principios de junio.

Su presencia no tiene ninguna incidencia directa sobre la salud humana. Las molestias por la observación de esta hormiga son estéticas y debidas a la gran capacidad de generación de canales de tránsito o caminos de búsqueda de alimento.